

⋮ ' 1

1 à ¸ 1 ̸ à ĭ ā √ Â

2 à п ¸ Л ā 1 Â

у à ¸ 1 0 4

1 à ¸ 1 ' 1

(1) ¸ 1 ì 2010 6 17 Ю ' 14' 00 Â

(2) ì : ¸ 1 1 1

ì' 2010 6 17 Э ' 9' 30 Í 11' 30 Ю ' 13' 00 Í 15:00 '

ц ì' 2010 6 16 Ю ' 15' 00

2010 6 17 Ю ' 15' 00 ž ' Â

2 à ¸ 1 ' 4 у 235 1 è 1 1 'Ω
1 428

3 à ¸ 1 ж' 'Ω 1 Y ¸ Â

4 à ¸ ŷ ж' 'Ω 1 Y "1 Â

5 à ' 2010 6 7 Â

(1) $E \propto \alpha$

é è :

 α

(2) È Ы Ж̃ α'

γ ã ñ ā α

п .. Л $\bar{\alpha}$ 1 @ ЛЮ

(Y) ê Ñ y ' à è H
 ĩ 2010 4 28 – ê n ĩ - Ō
 N 2010-20 Ō ~

151,568,604	151,816,204	99.84%
184,600		0.12%
63,000		0.04%

(Ω) ê ̃Ω ȳ g Ω ʌ Ì^ 2010 5 29 –
ê n Ì ʌ Ω ʌ 2010-26 Ω ̃ ~

Ь ă ъ п ā α

[illegible]

à é

1. $\gamma \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{J} \quad \text{ж} \quad \gamma \in \hat{A}$

2. $\lambda' \cdot \tilde{a} \in \hat{A}$

3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$

Й' Ω Λ π_γ Λ α Λ γ π_γ Ж^γ

$$\bar{a} \quad 1 \quad \bar{z} \quad 1 \quad \pi \quad \bar{\alpha} \quad \bar{\alpha} \quad \bar{\alpha} \quad 1 \in \Omega$$

Λ ἰ ᾱ ἐ Θ ὦ Λ π ῥ ‡ ἰ ᾱ ἐ ὦ Λ ἰ ι ἐ βι ῥ ὦ ᾱ

$$\hat{A}^{\tilde{\tau}\Omega} \quad \Pi \quad 1^{\tilde{\tau}\Omega} \quad \mathcal{H} \quad \bar{\alpha} \quad \mathfrak{Q} \quad \sim \quad \mathcal{A}$$
$$L \quad \quad \quad \Pi \quad \quad \quad \Pi \quad \quad \quad \bar{\alpha} \quad \quad \quad L\mathcal{E} \quad ,$$

⋮ Л п п ā ь† ž γ Л Э

$$\bar{\alpha} \quad \lambda \quad \bar{a} \quad \hat{A}$$

4. à

1 à 'Ω N 2010 Ъ ï п , ā '

2 ä ´ ž Ÿ Ł é ê ÿ ´ ´ Ω Λ
2010 Ъ ї п ˆ ˆ Ì Â

 $\Omega^{\wedge}$
$$\Omega \wedge Y_{\mathbb{R}^n}$$
$$\gamma \dot{n} \gamma \dot{n} \quad \Omega \quad \tilde{\omega}$$